

Whatsapp poruka koja se dijeli među liječnicima uz upućivanje na priopćenje HALMED-a

Primio prof. Walter Pascale iz bolnice IRCS Galeazzi u Milanu. Upravo je pokazano da virus ulazi u alveolarnu stanicu pluća preko ECAll receptora. Kad se veže za njega, prekomjerno ga izražava i ubija alveolarnu stanicu. Otuda sve što proizvodi. Muškarci imaju više receptora od žena, Azijci više od bijelaca, a ljudi koji uzimaju antihipertenzivne lijekove poput antiECA i posebno anti-ECAll imaju brutalnu prekomjernu ekspresiju receptora i stoga su osjetljiviji na infekcije i infekcija je ozbiljnija. , Teški slučajevi mladih su pacijenti koji su na početku bolesti uzimali protuupalne lijekove. Treba izbjegavati aspirin, ibuprofen, naproksen, voltaren (diklofenak) itd., Jer favoriziraju teške oblike. * Trebali biste uzimati samo paracetamol * Nemojte uzimati ibuprofen ili protuupalna sredstva ako sumnjate na Covid U Francuskoj 4 ozbiljna slučaja mladih bez prethodne patologije imaju zajednički unos ibuprofena. To je najava Ministarstva zdravlja. Očigledno da zaraza postaje znatno brža. Molimo podijelite koliko god je to moguće

<http://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2020/Europska-agencija-za-lijekove-objavila-savjete-o-primjeni-nesteroidnih-protuupalnih-lijekova-za-COVID-19/2307>